

И Н С Т Р У К Ц И Я
по медицинскому применению препарата
СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ-ДИА

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ-ДИА

Международное (непатентованное) название: сульфацетамид

Химическое название: N-[(аминофенил)сульфонил]ацетамид (в виде натриевой соли).

Лекарственная форма: капли глазные

Состав

1 мл содержит:

активное вещество –сульфацетамид натрия моногидрат (сульфацил натрия) (в пересчете на сухое вещество) – 100 мг (10% препарат), 200 мг (20% препарат);

вспомогательные вещества - натрия дисульфит (натрия метабисульфит), раствор натрия гидроксида (натра едкого) 1 М, вода очищенная – до 1 мл.

Описание: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство, сульфаниламид.

Код АТХ: S01AB04.

Фармакологическое действие

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия связан с конкурентным антагонизмом с ПАБК и угнетением дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой кислоты и, в конечном итоге, ее активного метаболита тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Сульфацил натрия-ДИА активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, Escherichia coli, Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., Actinomyces israelli, Toxoplasma gondii.

Фармакокинетика

Проникает в ткани и жидкости глаза. Всасывается в системный кровоток через воспаленную конъюнктиву.

Показания к применению

- Конъюнктивит;
- Блефарит;
- Гнойная язва роговицы;
- Профилактика и лечение бленфореи у новорожденных;
- Гонорейные и хламидийные заболевания глаз у взрослых.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью нет. Возможно применение сульфацетамида для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Способ применения и дозы

Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 5-6 раз в сутки. Для профилактики бленфореи у новорожденных – по 2 капли в каждый конъюнктивальный мешок непосредственно после рождения и по 2 капли – через 2 часа.

Побочные эффекты

Жжение, слезотечение, резь, зуд в глазах, аллергические реакции.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Особые указания.

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы, могут иметь повышенную чувствительность к сульфацетамиду.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместное применение с новокаином и дикаином снижает бактериостатический эффект сульфацила натрия. Наблюдается несовместимость сульфацила натрия при его совместном применении с солями серебра.

Форма выпуска

По 5 или 10 мл Сульфацил натрия-ДИА капли глазные (10% или 20% раствор сульфацетамида) во флаконы стеклянные или полипропиленовые, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные алюминиевыми колпачками, либо во флаконы-капельницы полиэтиленовые или полипропиленовые, герметизированные капельницами и навинчивающимися крышками.

1 флакон в комплекте с крышкой-капельницей или без нее вместе с инструкцией по применению в картонной пачке или в контурной ячейковой упаковке, помещенной в термосклеиваемый пакет.

1 флакон-капельница вместе с инструкцией по применению в картонной пачке или в контурной ячейковой упаковке, помещенной в термосклеиваемый пакет.

50 флаконов или флаконов-капельниц, предназначенных для стационара, вместе с 10-20 инструкциями по применению в картонной коробке.

Срок годности

2 года. Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C в защищенном от света.

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать замораживания.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.



Адрес производителя и предъявления претензий:

ЗАО «Институт молекулярной диагностики «ДИАФАРМ»
 140009, Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 20А.
 Телефоны: (495) 500-18-28, (495) 500-18-38.

И.о. директора ИДКЭЛС

А.Н.Васильев



Генеральный директор
 ЗАО «Институт молекулярной
 диагностики «ДИАФАРМ»

Л.А.Травина

