

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ОКТАЛЬМОЛ®

Регистрационный номер: Р N002176/01

Торговое наименование: Октальмол®

Международное непатентованное или группировочное наименование: аминокан-
зойная кислота

Химическое название: 4-аминоканзойная кислота

Лекарственная форма: капли глазные

Состав:

Действующее вещество: п-Аминоканзойная кислота - 0,07 мг;

Вспомогательные вещества: натрия хлорид – 9 мг, вода очищенная до 1 мл.

Описание: Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: противовирусное средство для местного применения.

Код АТХ: S03D.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Аминоканзойная кислота является индуктором интерферона, оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее, радиопротекторное действие, ускоряет регенерацию роговицы.

Препарат не обладает тератогенным, мутагенным, эмбриотоксическим действием.

Фармакокинетика

При инстиляции в конъюнктивный мешок аминоканзойная кислота быстро всасывается и проявляет терапевтическое действие.

Показания к применению

В качестве монотерапии и в составе комплексной терапии вирусных поражений глаза:

- конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератouveиты, вызываемые вирусом герпеса (*herpes simplex*, *herpes zoster*), аденовирусами;
- кератопатии инфекционного, посттравматического и послеоперационного генеза.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата Октальмол® во время беременности, лактации, а также у детей отсутствуют. Однако препарат может применяться в том случае, если предполагаемая польза превышает риск.

Способ применения и дозы

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 6-8 раз в день.

После клинического выздоровления продолжать инстилляцию по 2 капли 3 раза в день в течение 7 дней.

Побочное действие

В очень редких случаях наблюдаются конъюнктивальная гиперемия, местные аллергические реакции.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В комбинации с аналогами нуклеозидов (ацикловир, ганцикловир, и др.), противомикробными средствами (фторхинолоны) и антибиотиками (полимиксин В) усиливается терапевтическое действие этих препаратов.

Особые указания

Не применять препарат одновременно с сульфаниламидными препаратами и их производными (сульфацил-натрия).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не отмечено.

Форма выпуска

Капли глазные 0,007 %.

По 5 мл во флаконы-капельницы полиэтиленовые или полипропиленовые, герметизированные пробками-капельницами и навинчивающимися крышками.

1 флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. После вскрытия флакона-капельницы - 14 суток.

Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: без рецепта.

Производитель//Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Институт молекулярной диагностики «Диафарм»

Адрес места производства: 140009, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Митрофанова, д. 20А; тел./факс: 8 (495) 500-18-28.

Генеральный директор

АО «Диафарм»

Л.А. Травина